

UWAGA ! ASF

ZASADY OCHRONY STAD TRZODY CHLEWNEJ PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)

ZAREJESTRUJ ZWIERZĘTA I GOSPODARSTWO W BAZIE ARIMR



Nie wpuszczaj do chlewni osób postronnych



Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami



Nie wykorzystuj somy z poł, na których mogły przebywać dziki



DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ CHLEWNI MOŻE MIEĆ TYLKO WŁAŚCICIEL GOSPODARSTWA LUB OSOBA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ NAD ZWIERZETAMI



WYKŁADAJ MATY DEZYNFEKCYJNE PRZED WEJŚCIEM DO CHLEWNI



Nie bierz udziału w polowaniach na dziki



Nie zezwalaj na wjazd na teren gospodarstwa samochodów z zakładów mięsnych i utylizacyjnych



Nie karm świn odpadami kuchennymi



Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni



Nie kupuj i nie wprowadzaj do chlewni świń bez trwałego oznakowania (niewiadomego pochodzenia)



Obserwuj stan zdrowia świń o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii


Przestrzegaj Następujących Zasad, Aby Chronić Gospodarstwo Przed Zawleczeniem Wirusa

- ✓ Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.
- ✓ Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
- ✓ Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.
- ✓ Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
- ✓ Wylóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.
- ✓ Nie karm świń odpadkami kuchennymi.
- ✓ Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.
- ✓ Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.
- ✓ Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.



Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.



Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF

- ⤴ wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42°C. - brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;
- ⤴ UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt;
- ⤴ sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała
- ⤴ wybroczyny w skórze;
- ⤴ duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;
- ⤴ zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;
- ⤴ biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
- ⤴ zwiększone upadki



Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

- niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
- nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;
- zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego - zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.